

宇治徳洲会病院 胃癌レジメン一覧(2022年4月)

術後補助					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
CapeOX	21日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day1夕-15朝	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /Day
S-1+DOC	21日	点滴静注	Day1	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m <sup>2</sup>

進行・再発					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
S-1+CDDP(SPIRIT)	35日	点滴静注	Day8	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day1夕-22朝	S-1	80mg/m <sup>2</sup>
Cape+CDDP	21日	点滴静注	Day1	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day1夕-15朝	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>
CapeOX	21日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day1夕-15朝	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /Day
SOX	21日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m <sup>2</sup>
mFOLFOX6	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup> (46時間)
Cape+CDDP+HER	21日	点滴静注	Day1	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	トランスツマブ	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		内服	Day1夕-15朝	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
S-1+CDDP+HER	21日	点滴静注	Day1	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	トランスツマブ <sup>®</sup>	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m <sup>2</sup>
CapeOX+HER	21日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	トランスツマブ <sup>®</sup>	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		内服	Day1夕-15朝	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>
SOX+HER	42日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	トランスツマブ <sup>®</sup>	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m <sup>2</sup> /Day
triweekly DOC	21日	点滴静注	Day1	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>
5-FU+MTX	7日	点滴静注	Day1	メトレキサート	100mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	600mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day2-3	レボホリナート	10mg/kg
biweekly CPT-11+CDDP	28日	点滴静注	Day1・15	イリノテカン	30mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1・15	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>
CPT-11	28日	点滴静注	Day1・15	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>
triweekly nabPAC	21日	点滴静注	Day1	アブラキサン	260mg/m <sup>2</sup>
Ramucirumab+nabPAC	21日	点滴静注	Day1・15	ラムシルマブ <sup>®</sup>	8mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1・8・15	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>
Ramucirumab+PAC	21日	点滴静注	Day1・15	ラムシルマブ <sup>®</sup>	8mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1・8・15	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>
Ramucirumab	14日	点滴静注	Day1	ラムシルマブ <sup>®</sup>	8mg/m <sup>2</sup>
S-1+DOC	21日	点滴静注	Day1	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m <sup>2</sup>

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
S-1+HER	21日	点滴静注	Day1	ハーセプチン	8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降)
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m <sup>2</sup>
weekly PAC	28日	点滴静注	Day1・8・15	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>
weekly nabPAC	21日	点滴静注	Day1・8・15	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>
Nivolumab 2w	14日	点滴静注	Day1	ニボルマブ	240mg/body
Nivolumab 4w	28日	点滴静注	Day1	ニボルマブ	480mg/body
T-DXd	21日	点滴静注	Day1	エンハーツ	6.4mg/kg
CapeOX+Nivolumab	21日	点滴静注	Day1	ニボルマブ	360mg/body
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day1夕-15朝	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>
SOX+Nivolumab360mg	21日	点滴静注	Day1	ニボルマブ	360mg/body
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>
		内服	Day1夕-22朝	S-1	80mg/m <sup>2</sup>
FOLFOX+Nivolumab	14日	点滴静注	Day1	ニボルマブ	240mg/body
		点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup> (46時間)

・TrastuzumabはHER2陽性胃癌にのみ使用